

Simplex Barrel

Источник кремния, жизненно необходимого для растения элемента. Barrel укрепляет и защищает растение, активирует иммунную систему и повышает способность противостоять негативным факторам окружающей среды. Кремний улучшает транспортную систему растений и стимулирует поглощение фосфора. Barrel — сильно концентрированный продукт, поэтому не следует превышать рекомендуемые дозировки. Barrel может использоваться с любыми базовыми удобрениями и стимуляторами.



Показания к применению:

- Восполнение недостатка кремния в субстратах
- Повышение стрессоустойчивости растений
- Повышение механической прочности стволов и веток

Условия применения:


- Для закрытого грунта
- Для гидропонных систем любого типа
- Для кокосового субстрата

Фаза развития растения:

- Вегетация
- Предцвет
- Начало цветения

Состав Barrel

Кремний (SiO_2) — 10%
Растворимый калий (K_2O) — 7%



Таблицы применения



Стимуляторы

Период жизни растения

	Проращивание и укоренение	Вегетативный рост	Предцвет	Начало цветения	Развитие цветков	Созревание	Промывка
	Появление первой пары листьев	Набор зеленой массы растения	Набор зеленой массы растения, начало образования соцветий	Замедление роста растения, развитие соцветий	Уплотнение соцветий, остановка вертикального роста растений	Остановка роста соцветий	Подготовка к сбору урожая
Osmos, мл/л	—	1,0–2,0	1,5–2,0	1,5–2,0	1,5–2,0	1,5–2,0	—
Taste¹, мл/л	—	0,5–1,0	0,5–1,0	0,5–1,0	1,0–2,0	1,5–2,0	1,5–2,0
Solid², мл/л	—	—	—	0,5–1,0	—	—	—
Power³, мл/л	—	—	—	1,0–2,0	1,0–2,0	1,0–2,0	—
Mass⁴, мл/л	—	—	0,25–0,5	0,25–0,5	0,25–0,5	—	—
Vega⁵, мл/л	—	1,0–2,0	1,0–2,0	—	—	—	—
Barrel⁶, мл/л	—	0,1–0,25	0,25–0,5	0,25–0,5	0,25–0,5	—	—
EC раствора (+EC воды)⁷	0,4–0,6	0,5–1,3	1,1–1,3	1,4–1,8	1,4–1,8	0,6–0,9	0,4–0,6
pH питательного раствора				6,5			

¹ Применяйте Taste начиная со второй недели вегетативного роста.

² Используйте Solid на третьей-четвертой неделе цветения.

³ Не используйте Power чаще чем через 2-3 недели после последней обработки. Использовать Power можно **только по листу!**

⁴ Не используйте Mass чаще чем через 1-2 недели после последней обработки.

⁵ Vega применяется по листу один раз за указанный период. Ослабленные неинфекционными хлорозами растения можно обработать раствором Vega в концентрации 2мл/л.

⁶ Barrel добавляется в последнюю очередь после внесения все компонентов. Повышает pH, необходим контроль pH раствора.

⁷ Максимальные значения EC рассчитаны для здоровых, крупных растений. Если значение EC в питательном растворе выше указанного, необходимо разбавить раствор водой.