

Simplex Taste

Стимулятор вкуса и аромата, способствующий выведению накопленных минеральных соединений. Taste содержит комплекс сахаров, который является источником энергии для формирования всех тканей растения, а также влияет на усвоение питательных веществ из субстрата. Taste повышает качество урожая и делает его экологически чистым.



Показания к применению:

- Улучшение органолептических качеств урожая
- Выведение накопленных минеральных соединений
- Стимулирование роста микоризы

Условия применения:


- Для открытого и закрытого грунта
- Для любых почвосмесей
- Для гидропонных систем любого типа

Фаза развития растения:

- Вегетация
- Предцвет
- Начало цветения
- Развитие цветков
- Созревание
- Промывка

Состав Taste

Растворимый магний (MgO)
Растворимая сера (SO₃)
Комплекс легкоусвояемых сахаров
Витамин B4 (Бетаин)
Сапонины (Экстракт юкки)
Фульвокислоты биологического происхождения



Таблицы применения



Стимуляторы

Период жизни растения

	Проращивание и укоренение	Вегетативный рост	Предцвет	Начало цветения	Развитие цветков	Созревание	Промывка
	Появление первой пары листьев	Набор зеленой массы растения	Набор зеленой массы растения, начало образования соцветий	Замедление роста растения, развитие соцветий	Уплотнение соцветий, остановка вертикального роста растений	Остановка роста соцветий	Подготовка к сбору урожая
Osmos, мл/л	—	1,0–2,0	1,5–2,0	1,5–2,0	1,5–2,0	1,5–2,0	—
Taste¹, мл/л	—	0,5–1,0	0,5–1,0	0,5–1,0	1,0–2,0	1,5–2,0	1,5–2,0
Solid², мл/л	—	—	—	0,5–1,0	—	—	—
Power³, мл/л	—	—	—	1,0–2,0	1,0–2,0	1,0–2,0	—
Mass⁴, мл/л	—	—	0,25–0,5	0,25–0,5	0,25–0,5	—	—
Vega⁵, мл/л	—	1,0–2,0	1,0–2,0	—	—	—	—
Barrel⁶, мл/л	—	0,1–0,25	0,25–0,5	0,25–0,5	0,25–0,5	—	—
EC раствора (+EC воды)⁷	0,4–0,6	0,5–1,3	1,1–1,3	1,4–1,8	1,4–1,8	0,6–0,9	0,4–0,6
pH питательного раствора				6,5			

¹ Применяйте Taste начиная со второй недели вегетативного роста.

² Используйте Solid на третьей-четвертой неделе цветения.

³ Не используйте Power чаще чем через 2-3 недели после последней обработки. Использовать Power можно **только по листу!**

⁴ Не используйте Mass чаще чем через 1-2 недели после последней обработки.

⁵ Vega применяется по листу один раз за указанный период. Ослабленные неинфекционными хлорозами растения можно обработать раствором Vega в концентрации 2мл/л.

⁶ Barrel добавляется в последнюю очередь после внесения все компонентов. Повышает pH, необходим контроль pH раствора.

⁷ Максимальные значения EC рассчитаны для здоровых, крупных растений. Если значение EC в питательном растворе выше указанного, необходимо разбавить раствор водой.